

Mortinaissance et deuil : Lignes directrices pour l'enquête faisant suite à une mortinaissance

La présente directive clinique a été élaborée par le comité de médecine fœto-maternelle (MFM) et a été évaluée par le comité de pratique clinique – obstétrique. Elle a été approuvée par le comité exécutif et le Conseil de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

AUTEUR PRINCIPAL

Line Leduc, MD, FRCSC, Montréal (Québec)

COMITÉ DE MÉDECINE FŒTO-MATERNELLE

Dan Farine, MD, FRCSC (président), Toronto (Ont.)

B. Anthony Armson, MD, FRSCS, Halifax (N.-É.)

Monica Brunner, MD, FRCSC, North Vancouver (C.-B.)

Joan Crane, MD, FRCSC, St. John's (T.-N.-L.)

Marie-France Delisle, MD, FRCSC, Vancouver (C.-B.)

Robert Gagnon, MD, FRCSC, London (Ont.)

Lisa Keenan-Lindsay, inf. aut., Oakville (Ont.)

Valérie Morin, MD, FRCSC, Montréal (Québec)

Robert W Mundle, Windsor (Ont.)

Carol Scheider, MD, FRCSC, Winnipeg (Man.)

John Van Aerde, MD, FRCSC, Edmonton (Alb.)

Avantages : Offrir de meilleurs conseils aux femmes au sujet des causes possibles de mort fœtale et des implications en ce qui concerne les futures grossesses.

Recommandations : Un protocole d'enquête devrait être utilisé pour chercher à mettre au jour la cause d'une mort fœtale. (II-B)

Validation : Les résultats obtenus ont été analysés et évalués par le comité de médecine fœto-maternelle et le comité de pratique clinique - obstétrique de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Le niveau des résultats et la qualité des recommandations ont été décrits au moyen des critères d'évaluation des résultats du Groupe d'étude canadien sur l'examen médical périodique.

Commanditaire : La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

J Obstet Gynaecol Can, vol. 28, n° 6, 2006, p. 546–552.

Résumé

Objectif : Fournir un protocole d'enquête pour aider les fournisseurs de soins de santé à déterminer la cause d'une mort fœtale.

Options : Nous avons pris en considération les protocoles d'enquête sur les morts fœtales qui sont actuellement disponibles au Canada et dans d'autres pays.

Issues : Identification des causes possibles de mortinaissance et leur relation avec les futures grossesses.

Résultats : Des articles associés à l'étiologie de la mort fœtale ont été recensés au moyen d'une recherche menée dans MEDLINE (de janvier 1993 à décembre 2004), la *Cochrane Library* et des protocoles d'enquête issus du *American College of Obstetricians and Gynecologists*, du *Alberta Medical Association Committee on Reproductive Care* et du *Centers for Disease Control and Prevention National Center for Health Statistics*.

Mots clés : Intrauterine fetal death investigation, fetal demise, stillborn

Les directives cliniques font état des percées récentes et des progrès cliniques et scientifiques à la date de publication de celles-ci et peuvent faire l'objet de modifications. Il ne faut pas interpréter l'information qui y figure comme l'imposition d'un mode de traitement exclusif à suivre. Un établissement hospitalier est libre de dicter des modifications à apporter à ces opinions. En l'occurrence, il faut qu'il y ait documentation à l'appui de cet établissement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans une permission écrite de la SOGC.