

Endométriose vulvaire

Jaouad Kouach, Mehdi ElHassani, Driss Rahali Moussaoui, Dehayni Mohamed

Service de gynécologie et d'obstétrique, Hôpital militaire Mohamed V Rabat, Maroc

Une femme multipare de 37 ans présentait des douleurs vulvaires cycliques étant apparues neuf mois à la suite de l'accouchement. Elle présentait également une tuméfaction vulvaire. Elle ne présentait aucun symptôme vésical ou intestinal et son cycle menstruel était régulier.

L'examen pelvien a révélé la présence d'une tuméfaction brunâtre, douloureuse à la palpation, siégeant sur la face interne de la grande lèvre droite (Figure 1). Aucune autre anomalie n'a été révélée par l'examen pelvien.

La lésion a par la suite été retirée sous anesthésie générale. Sur le plan histologique, il a été démontré que cette lésion était un kyste endométriotique; la présence de glandes endométriales et de stroma a été constatée (Figure 2). La patiente a connu des suites postopératoires sans incident. Ses symptômes sont disparus et, 17 mois à la suite de l'intervention, elle ne présentait toujours pas de récurrence.

La patiente a consenti à la publication de ces images.

J Obstet Gynaecol Can, vol. 30, n° 12, 2008, p. 1096

Figure 1



Figure 2

