

# Résultat hystérosalpingographique inattendu

Yan Wang, MD, MSc, Wael Jamal, MD, FRCSC, Isaac Jacques Kadoch, MD

Département d'obstétrique-gynécologie, CHUM-Hôpital St-Luc, Université de Montréal, Montréal (Québec)

Une nullipare de 25 ans a subi une hystérosalpingographie dans le cadre d'une évaluation visant l'infertilité primaire à la suite de 16 semaines d'aménorrhée. Une analyse d'urine visant la grossesse menée huit semaines plus tôt avait généré des résultats négatifs.

À la suite de la visualisation de l'image hystérosalpingographique (Figure), le radiologiste a orienté la patiente d'urgence vers nos services. Une échographie pelvienne menée sur-le-champ a révélé la présence d'une grossesse intra-utérine vivante dont l'âge gestationnel estimatif était de huit semaines. Après avoir été avisée du faible risque de malformation fœtale, d'avortement spontané et d'hypothyroïdie fœtale, la patiente a décidé de poursuivre sa grossesse. Elle a fait l'objet d'un suivi au sein d'une clinique se spécialisant dans les cas de grossesses exposées à des risques élevés et a accouché (par voie vaginale) d'une enfant en santé à la 39<sup>e</sup> semaine de gestation, sans complications. Le suivi postnatal n'a révélé aucun symptôme d'hypothyroïdie chez l'enfant.

Il est rare de constater une grossesse inattendue dans le cadre d'une hystérosalpingographie (incidence publiée : 0,06 %)¹. Cinq des 11 cas signalés dans la littérature se sont soldés en une poursuite réussie de la grossesse jusqu'au terme¹-⁴.

La patiente a consenti à la publication de cette image.

## RÉFÉRENCES

1. Justesen P, Rasmussen F, Andersen PE Jr. « Inadvertently performed hysterosalpingography during early pregnancy », *Acta Radiol Diagn (Stockh)*, vol. 27, n° 6, 1986, p. 711-3.
2. Cheung GW, Lok IH, Wong A, Yip SK. « Unsuspected pregnancy at hysterosalpingography: a report of three cases with different outcomes », *Hum Reprod*, vol. 18, n° 12, 2003, p. 2608-9.
3. Isaacs I. « Hysterographic double-outlined uterine cavity: a sign of unsuspected pregnancy », *Am J Roentgenol*, vol. 131, n° 2, 1978, p. 305-6.
4. Jongen VH, Collins JM, Lubbers JA, van Selm M. « Unsuspected early pregnancy at hysterosalpingography », *Fertil Steril*, vol. 76, n° 3, 2001, p. 610-1.

J Obstet Gynaecol Can, vol. 31, n° 7, 2009, p. 598

**Grossesse constatée au cours de l'hystérosalpingographie (les flèches indiquent le sac gestationnel)**

